Acariens recueillis en Tunisie (Le Kef), par M. le Dr Larrousse, dans des terriers de petits Rongeurs,

par M. Marc André.

(*3e Liste*[1].)

Famille des **LAELAPTIDÆ**.

Laelaps myrmecophilus Berlese ♀ (1892, *A. M. Sc. Ital.*, fasc. 69, n° 22) [*non L. myrmecophilus* Moniez [2]]. — Espèce signalée en Italie et en Hollande, dans des nids de Fourmis.

Cosmolaelaps cuneifer Michael ♀ (1891, Assoc. of Gamasids with Ants, p. 7). — Recueilli assez communément en Europe, dans des fourmilières. Michael l'a signalé près d'Innsbruck (Tyrol) dans les nids du *Camponotus herculeanus* L. et le P. Wasmann dans ceux du *Lasius fuliginosus* Latr. à Exaeten (Hollande).

Laelaps astronomicus C. L. Koch [*Iphis*] (1839, *C. M. A. Deutsch.*, fasc. 27, fig. 18) = *Zercon ciliatus* C. L. Koch (1839, *ibid.*, fasc. 27, fig. 9) [*non Iphis ciliatus* Koch]. — Recueilli en Italie par Berlese.

Ololaelaps [3] holaspis Oudemans ♀ [*Hypoaspis*] (1902, *Tijdschr. v. Entom.*, XLV, Verslagen, p. 53). — Trouvé par le Prof. O. Schneider à San Remo (Italie).

Pseudolaelaps Doderoi Berlese ♀ (1910, *Redia*, p. 259). — Recueilli par l'auteur aux environs de Gênes, dans de l'humus.

Pseudolaelaps Paulseni Berlese ♀ (1910, *Redia*, p. 259). — Trouvé par l'auteur dans des mousses aux environs de Palerme.

[1] 1re liste : *Oribatidæ* (*Bull. Mus. Paris*, 1923, n° 7, p. 506).
2e liste : *Trombidiidæ* (*Bull. Mus. Paris*, 1924, n° 4, p. 272).

[2] L'espèce que Moniez (1894, Sur quelques Arthropodes trouvés dans des fourmilières, *Rev. biol. Nord de la France*, VI, p. 204) décrit sous le nom de *L. myrmecophilus* Berlese est, en réalité, le *L. laevis* Michael.

[3] Il serait préférable d'écrire *Hololaelaps*.

Famille des **GAMASIDÆ.**

Vegaia cervus Kramer [*Gamasus*] (1876, Gamasiden, p. 83, tab. V, fig. 17-19). — Observé dans presque toute l'Europe.

Pergamasus robustus Oudemans [*Parasitus*] (1901, *Tijdschr. v. Entom.*, p. 38). — Cette espèce n'avait encore été signalée que dans le Nord de l'Europe, en Allemagne et en Norvège.

Gamasus spinipes C. L. Koch ♂ (1837, *C. M. A. Deutschs*, fasc. 16, n° 8) = *G. hortivagus* Berlese[1] (1903, *Redia*, p. 240). — Espèce déjà recueillie en Italie (Florence) sous des feuilles mortes putréfiées.

Ologamasus[2] pollicipatus Berlese ♂ (1903, *Redia*, vol. I, fasc. I, p. 238). — Recueilli aussi en Italie septentrionale par l'auteur.

Famille des **BDELLIDÆ.**

Ammonia latirostris Hermann [*Scirus*] (1804, *Mém. Apt.*, p. 62, tab. III, fig. 11). — Trouvé dans toute l'Italie dans les mousses, sous les pierres et sur les arbres.

[1] Le nom de *Gamasoides spinipes* a été donné par Say en 1821 à une forme qui n'est pas le *Gamasus spinipes* de Koch, car elle n'est pas citée par Berlese (1906, *Redia*, III [1905], p. 291) dans la synonymie de cette dernière espèce. L'appellation de *Parasitus spinipes* a été attribuée par Oudemans en 1903 à une espèce restée énigmatique pour Berlese (1906, *ibid.*, p. 291). D'après une communication verbale du Prof. Berlese, la forme qu'il a nommée *hortivagus* (1904, *Redia* [1903], p. 240) est le véritable *G. spinipes* Koch.

[2] Ou plutôt *Hologamasus*.